



Fiche descriptive du bleuetier en corymbe

NOM COMMUN : Bleuet en corymbe

NOM LATIN : Vaccinium corymbosum L.

FAMILLE : Ericaceae

Comparativement au bleuet nain qui se développe en talles, le bleuet en corymbe est buissonnant, ce qui facilite sa culture en rang et les fruits sont de 3 à 5 fois plus gros. Amorcée au Québec dans les années 1960, la production se développe plutôt rapidement depuis une dizaine d'années. Des hybrides ont été développés au cours de la première moitié du 20^e siècle par l'USDA, par reproduction sélective du bleuetier nain indigène. Ce bleuetier est un arbuste magnifique qui produit de beaux gros fruits mais il faut tenir compte de sa rusticité au moment de l'achat

HAUTEUR DU PLANT : La hauteur peut varier entre 0,6 à 1,8 mètre selon les variétés.

LARGEUR DU PLANT : La largeur peut varier entre 0,7 à 2,1 mètres selon les variétés

ZONE DE RUSTICITÉ : Les zones de rusticité vont de 3 à 8. Les plants peuvent résister jusqu'à - 32 degrés Celsius.

PÉRIODE DE CUELLETTE : Les fruits sont prêts à être cueillis vers fin juin jusqu'au début de septembre. La période de récolte varie selon les variétés. Le fruit est prêt quand celui-ci est bleuté. Une fois devenu bleu, le goût du fruit va s'améliorer pendant une semaine encore. Normalement, on fait une récolte par semaine pendant 4 à 5 semaines.

RENDEMENT : La quantité des fruits produits varie énormément selon les variétés. On peut atteindre jusqu'à 12 livres de fruits par plant selon le type de cultivar.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT : Choisir de préférence un endroit ayant une légère pente qui favorise le drainage de l'air froid et de l'eau. Il est préférable d'être à l'abri du vent. Le sol doit être léger sableux ou graveleux. Le pH doit varier entre 4,2 et 5,2, mais le meilleur serait de 4,8. De plus, le sol doit contenir au moins de 4 à 5 % de matière organique. Si possible, choisir une place où il y a de fortes accumulations de neige pour protéger les bourgeons du froid hivernal.





PLANTATION : Il est préférable de planter durant le printemps. Lors de la plantation, on doit enterrer la motte de 5 à 8 cm de profond par rapport à sa base. De plus, il est préférable de placer de la mousse de tourbe dans le fond du trou et le mélanger avec le sol qui est présent. Planter au minimum 2 à 3 variétés, ce qui aura pour effet d'augmenter le nombre de fruits produits. Il faut distancer les plants d'un mètre et demi environ.

TAILLE DU PLANT : La taille doit se faire au printemps (mois d'avril). Pour les premières années et même les années suivantes. La taille consiste surtout à enlever les branches mortes, cassées, malades, trop basses et celles qui encombrant trop le centre. Il faut toujours maintenir un équilibre entre les tiges vieilles et jeunes pour promouvoir une bonne production.

TRUCS ET ASTUCES :

- Il est extrêmement recommandé de faire une analyse du sol pour connaître le pH de celui-ci et faire des amendements sur celui-ci comme par exemple ajouter du soufre un an avant la plantation.
- Utiliser un mélange de tourbe lors de la plantation pour favoriser la rétention de l'eau et des éléments nutritifs.
- Il serait important de brûler les branches coupées lors de la taille pour éviter la propagation des maladies.

RECETTES DE TRANSFORMATIONS DU BLEUET EN CORYMBE :

Tarte aux bleuets

Confiture

Mousse aux bleuets